

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek Bilobil Forte jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia należy stosować ten lek ostrożnie, zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

BILOBIL FORTE, 80 mg, kapsułki twarde

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum

Skład

Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z *Ginkgo biloba* L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

- 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,
- 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,
- 2,08-2,56 mg bilobalidu.

Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Susbtancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk;

Substancje otoczki kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa (E 151), błękit patentowy V (E 131), czerwień koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).

Dostępne opakowania leku zawierają

- 20 kapsułek
- 60 kapsułek
- 90 kapsułek

Podmiot odpowiedzialny

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia

Spis treści:

1. Co to jest lek Bilobil Forte i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Bilobil Forte
3. Jak stosować lek Bilobil Forte
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Bilobil Forte
6. Inne informacje

1. Co to jest lek Bilobil Forte i w jakim celu się go stosuje

Bilobil forte jest lekiem zawierającym kwantyfikowany i oczyszczony suchy wyciąg z liści miłorzębu, usprawniającym krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się: glikozydy flawonowe i laktony terpenowe (ginkgolid i bilobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek krwi. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami

wywoływany przez niedobór tlenu oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Bilobil forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:

- osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
- pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

2. Zanim zastosuje się lek Bilobil Forte

Nie należy zażywać leku Bilobil Forte w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil forte u dzieci.

Stosując Bilobil Forte należy zachować szczególną ostrożność

- u pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).

Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi o stosowaniu tego leku należy poinformować lekarza.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jedna kapsułka zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. Jeśli pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami, przyjmuje każdorazowo 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku w okresie ciąży należy zasięgnąć porady lekarskiej. Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się zażywania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie było doniesień o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil Forte u pacjentów stale zażywających preparaty kwasu acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe.

W przypadku zażywania innych leków należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

3. Jak stosować lek Bilobil Forte

Zaleca się następujące dawkowanie:

- u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę
- w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem
- w objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem

Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.

Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Kurację można kontynuować przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia dawki leku Bilobil Forte nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia dawki pominiętej, lecz przyjąć normalną dawkę o przypadającej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Podobnie jak wszystkie inne leki, również Bilobil forte może wykazywać działania niepożądane, w bardzo rzadkich przypadkach może dojść po przyjęciu leku do lżejszych zaburzeń pokarmowych, bólów głowy, krwawień lub skórnych reakcji typu nadwrażliwości (świąd, wysypka).

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek działania niepożądanego, również takiego, które nie zostało wyszczególnione w tej ulotce, należy poinformować o nim lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie preparatu Bilobil Forte

Leku nie należy przyjmować po upływie daty ważności

Przechowywać w temperaturze do 25° C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

KRKA Polska Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Równoległa 5

Tel. (22) 5737500

Data zatwierdzenia ulotki: