

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

### HALSET, 1,5 mg, tabletki do ssania

*Cetylpyridinii chloridum*

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Halset ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.>
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Halset i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Halset
3. Jak stosować lek Halset
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Halset
6. Inne informacje

### 1. CO TO JEST LEK HALSET I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Halset zawiera cetylopirydyniowy chlorek. Lek działa miejscowo odkażająco w zapaleniach jamy ustnej i gardła. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz działa na niektóre grzyby. Halset nie zawiera cukru.

#### Wskazania do stosowania

Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HALSET

#### Kiedy nie stosować leku Halset

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Halset,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna).

Nie stosować u dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

#### Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Halset

- jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się z lekarzem,
- w przypadku ciężkich zakażeń lub bólu gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami, wymiotami lub jeśli objawy nasiliły się albo nie ustąpią po trzech dniach należy zgłosić się do lekarza.

### **Stosowanie innych leków**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Halset**

Lek zawiera sorbitol. Jedna tabletkę do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz punkt **Kiedy nie stosować leku Halset**). Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK HALSET**

Lek Halset należy stosować zgodnie z informacjami podanymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Halset stosować doustnie.

Ssać powoli po jednej tabletkę.

### **Zazwyczaj stosowana dawka:**

**Dorośli i młodzież:** ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

### **Stosowanie u dzieci**

**Dzieci w wieku powyżej 6 lat:** ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

**Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.**

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Halset**

Stosowanie większej liczby tabletek Halset niż zalecane może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności, wymioty.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Pominięcie zastosowania leku Halset**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku Halset**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, Halset może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej, nudności i przemieszanie zaburzenia smaku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

## **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HALSET**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.  
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Halset po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. INNE INFORMACJE**

### **Co zawiera lek Halset**

- Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek jednowodny. Jedna tabletkę do ssania zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.
- Ponadto lek zawiera sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

### **Jak wygląda lek Halset i co zawiera opakowanie**

Tabletki do ssania.

Tabletki Halset są prostokątne, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni, zaokrąglonych narożnikach i krawędziach, białe, z połyskiem, o słodkim, miętowym smaku i mentolowym zapachu.

Wielkość opakowania: 18 lub 24 tabletek.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

BIOFARM Sp. z o.o.  
ul. Wałbrzyska 13  
60-198 Poznań  
Polska  
Tel. 061 66 51 500

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska  
Biofarm Sp. z o.o.  
ul. Wałbrzyska 13  
60-198 Poznań  
Polska  
Tel. 061 66 51 500

### **Data zatwierdzenia ulotki:**

07.04.2010