

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Junior
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

Skład:

Jedna pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: esencję truskawkową, antocyjaninę (E 163), sacharynę sodową (E 954), kwas winowy, maltitol ciekły (E 965), izomalt.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

8 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990778515
12 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990781478
16 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990778522
24 pastylki twarde	Kod EAN: 5909990778539
36 pastylek twardych	Kod EAN: 5909990646500

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wytwórca: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Wielka Brytania
Reckitt Benckiser (Logo)

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 7785

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.
Dwie substancje o działaniu przeciwbakteryjnym.
Pastylki truskawkowe bez cukru.

Co to jest lek Strepsils Junior i w jakim celu się go stosuje

Każda pastylka Strepsils Junior zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym.
Pastylki Strepsils Junior są przeznaczone do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Kiedy nie należy stosować leku Strepsils Junior:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wartość kaloryczna jednej pastylki wynosi 5,5 kcal/23 kJ.

Lek zawiera maltitol i izomalt. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Oddziaływanie z innymi lekami:

Dotychczas nie są znane istotne interakcje.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak stosować pastylki Strepsils Junior

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przedawkowanie: Mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Mogą wystąpić reakcje alergiczne i bolesność języka.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Strepsils Junior