Ulotka dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Venoforton ostrożnie i zgodnie z informacja w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach, należy skonsultować się z lekarzem

[LOGO FIRMY]

Lek roślinny

VENOFORTON®

Płyn doustny

100 g produktu leczniczego zawiera:

Wyciąg z owoców kasztanowca *(Intractum Hippocastani)-40,0g,* nalewka z miłorzębu *(Tinctura Ginkgo bilobae* -37,0g, nalewka z kwiatostanu głogu *(Crataegi tinctura)*- 10,0g, wyciąg z ziela jemioły *(Intracum Visci)*- 10,0g, nalewka z ziela arniki *(Tinctura Arnicae)*- 3,0g.

Zawartość opakowania: 125g

Zawartość etanolu: 55-70% (v/v)

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury" Tadeusz Polański, 08-500 Ryki; ul. Zielona 30.

Tel/ fax: (081) 865 10 69, 865 69 55

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje.

2. Zanim zastosuje się lek Venoforton.

3. Jak stosować lek Venoforton.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie leku Venoforton

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Venoforton.

1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje.

Venoforton jest produktem leczniczym roślinnym w postaci płynu doustnego, którego 100 g zawiera: Wyciąg z owoców kasztanowca *(Intractum Hippocastani)-40,0g,* nalewka z miłorzębu *(Tinctura Ginkgo bilobae* -37,0g, nalewka z kwiatostanu głogu *(Crataegi tinctura)*- 10,0g, wyciąg z ziela jemioły *(Intracum Visci)*- 10,0g, nalewka z ziela arniki *(Tinctura Arnicae)*-3,0g.

Wskazania do stosowania:

Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żylnej (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki), krążenia obwodowego (redukuje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie w niewydolności krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Zanim zastosuje się lek Venoforton.

Venoforton zawiera alkohol etylowy (55-70% v/v) i może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

Wprawdzie wystąpienie działanie szkodliwego na nerki przy stosowaniu dawek zgodnych z zaleceniami jest praktycznie mało prawdopodobne, jednakże przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować parametry czynnościowe nerek.

Stosowanie leku Venoforton u dzieci: Leku Venoforton nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia , ze względu na zawartość etanolu - 55-70% (v/v).

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku Venoforton podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenia pojazdów i obsługa maszyn: Przy stosowaniu zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń w ruchu.. Przy dawkach przekraczających zalecane może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych, na skutek przyjęcia zwiększonej dawki etanolu.

Stosowanie innych leków: Interakcje nieznane. Powinno się jednakże unikać stosowania preparatu równocześnie z gentamycyną. Ze względu na obecność nalewki z miłorzębu może dojść do zmiany czasu krzepnięcia podczas równoczesnego stosowania warfaryny.

3. Jak stosować lek Venoforton.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 4 razy dziennie po 3 ml, 30 min przed jedzeniem, rozpuszczając lek w małej ilości wody, korzystnie soku owocowego.

W przypadku zażycia większej dawki leku Venoforton niż zalecana: Przy znacznym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia alkoholowego; biegunka, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie mięśni. Należy zbadać wówczas czynność nerek.

W przypadku pominięcia dawki leku Venoforton: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane.

Bardzo rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. Sporadycznie mogą wystąpić nudności.

Jak każdy lek, lek Venoforton może powodować działania niepożądane. W przypadku

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

wystąpienia innych objawów, niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Venoforton.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dopuszczalne lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury" Tadeusz Polański, 08-500 Ryki; ul. Zielona 30, Polska. Tel/fax: (081) 865 10 69, 865 69 55.

Data opracowania ulotki: 25 wrzesień 2008r.

2008 -12- 10

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15